

SKAL JEG VACCINERE MOD BLUETONGUE?

Har du spørgsmål til vaccination, så tag en snak med din dyrlæge.

Smittesæsonen starter omkring midt maj og varer til slutningen af november med størst smitterisiko omkring august og september.

Husk at tage højde for vaccinationsintervaller, og den tid der går, før vaccinen virker.

Start derfor vaccination i god tid.

Selvom din besætning har været smittet med bluetongue, er det ikke sikkert, at alle dine dyr har været smittet. Du kan derfor stadig opleve nye udbrud i besætningen.

Vaccination hindrer ikke, at dine dyr smittes med bluetongue, men vaccinationen kan beskytte dyrene mod alvorlige symptomer.



Vær særligt opmærksom på at:

- Udegående dyr har større risiko for at blive smittet
- Får rammes hårdere end kvæg
- Parasitter og andre sygdomme øger risikoen for at dyrene bliver syge af bluetongue.

Antal af vaccinedoser afhænger af vaccinen og fremgår af indlægssedlen.

Hvis mange vælger at vaccinere kan vi dæmpe spredningen af sygdommen. Du kan bidrage til dette ved at vaccinere dine dyr.

Der kan være krav om vaccination i dine forsikringer. Tag kontakt til dit forsikringselskab for at høre til din police.

Læs mere:



Landbrug & Fødevarer



LandbrugsInfo



Fødevarestyrelsen



Dansk Fåreavl



Dansk Gede Union